

Эпидситуация по кори

В Свердловской области сложилась неблагоприятная ситуация по заболеваемости корью среди детей и взрослых. Первые случаи инфекции были зарегистрированы в начале октября у детей до 14 лет в городе Екатеринбург. На 21.11.2016 в Екатеринбурге уже 35 зарегистрированных коревых больных из них 3 заболевших в г. Ревда, диагноз корь подтвержден у 20 человек.

Что такое корь?

Корь является воздушно-капельной инфекцией, причем инфекция считается летучей. То есть возбудитель быстро переходит от больного человека к здоровому. Для этого людям достаточно находиться в одном помещении.

Как узнать, что у меня корь?

Основные симптомы болезни: высокая температура, 38-40 градусов, кашель, насморк, светобоязнь, отечность лица, пятнистая сыпь, которая может появиться как на слизистых оболочках, так и на кожных покровах. При этом пятна сыпи сливаются.

Что делать, если у меня присутствуют все перечисленные симптомы?

Главное — ни в коем случае не ходите в поликлинику, вызывайте врача на дом. Постарайтесь вспомнить, в каком месте у вас мог быть контакт с коревым больным, возможно, вы обращались в какие-либо медучреждения на консультацию. И не пытайтесь списать, что сыпь появилась в результате аллергии на пищевые продукты или на лекарства. Ни в коем случае нельзя заниматься самолечением.

Корь — детская болезнь или взрослый тоже может заболеть?

Корь опасна для всех. Особенно опасна она для тех детей и тех взрослых, которые раньше не болели корью, не имеют двух прививок или по ним нет сведений о вакцинации.

Нужна ли прививка от кори?

Восприимчивость к кори практически 100%-ая. Поэтому на сегодня все дети и взрослые должны быть привиты от кори, конечно, с учетом медицинских показаний и противопоказаний. До 6 лет однократно, в возрасте 6 лет они получают возрастную ревакцинацию. Если у человека есть 2 прививки, шансы на то, что он заболит минимальны.

Прививки переносятся абсолютно нормально, и отечественная, и импортная. В случае если вы вовремя, по графику не привились и не привили своего ребенка, и подозреваете, что у вас был контакт с больным корью, в течение 72 часов с момента контакта можно поставить прививку.

На основании приказа №370н от 16.06.2016 «О внесении изменений в приложение №1 и №2 к Приказу Министерства здравоохранения РФ от 21.03.2014г. №125н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря прививок по эпидемическим показаниям» в графу вакцинация и ревакцинация против кори были внесены изменения

Дети от 1 года до 18 лет (включительно) и взрослые до 35 лет (включительно), не болевшие, не привитые, привитые однократно, не имеющие сведений о прививках против кори; взрослые от 36 до 55 лет (включительно), относящиеся к группам риска (работники медицинских и образовательных организаций, организаций торговли, транспорта, коммунальной и социальной сферы; лица, работающие вахтовым методом, и сотрудники государственных контрольных органов в пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации), не болевшие, не привитые, привитые однократно, не имеющие сведений о прививках против кори	Вакцинации против кори, ревакцинации против кори подлежат
---	---

Я не хочу/не могу ставить прививку ребенку, чем это чревато?

На период возникновения неблагоприятной ситуации, непривитые дети могут быть отстранены от учебного процесса в школе или в дошкольном учреждении.